

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

ろくみがん
トチモトの 六味丸

「六味丸」は、漢方の古書「小児方訣」に記載されている漢方処方「六味地黄丸」を
基本に6種の生薬末を合わせ、ハチミツを加え丸剤としたものです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の
持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：
排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ

【用法・用量】

15才以上 1回20丸、1日3回、食前又は食間に服用
15才未満の小児：服用しないでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

定められた用法・用量を厳守してください。
食間とは、食後2～3時間を指します。

【成分・分量】

本品1日量（60丸、6,000mg）中

ジオウ末・・・1,200mg

サンシュユ末・・・600mg

日本薬局方 サンヤク末・・・600mg

日本薬局方 タクシャ末・・・450mg

日本薬局方 ブクリョウ末・・・450mg

日本薬局方 ボタンピ末・・・450mg

添加物としてコメデンプン、ハチミツを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して
ください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤はハチミツを入れて製丸していますので、容器中で丸剤どうし
がくっつくことがあります。薬効には変わりありませんので、軽く
振ってご使用ください。
- (5) 本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異な
ることがありますが、効果には変わりありません。
- (6) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、
これを食べたりしないようご注意ください。

■お客様相談窓口

株式会社 栃本天海堂 品質保証部・品質保証課
TEL 06-7711-0730
メールアドレス customer@tochimoto.co.jp
受付時間 10時～17時まで(土、日、祝日を除く)

株式会社 栃本天海堂 大阪市北区末広町3番21号